

Cómo recolectar y transportar muestras de heces para diferentes pruebas

Debe recolectar y transportar correctamente su muestra para que los resultados de la prueba sean válidos. Las instrucciones que figuran a continuación son para las siguientes pruebas:

- Prueba de detección del Clostridium difficile por PCR
- Análisis de grasa fecal
- Análisis de leucocitos fecales
- Examen para antígeno del rotavirus

Si se ha sometido a alguna de estas pruebas en las últimas 3 semanas, informe a su médico antes de recolectar una muestra.

Cómo recolectar una muestra

Asegúrese de que su nombre y fecha de nacimiento figuren en el recipiente.

1. Recolecte una muestra pasando las heces:

- Sobre un plato de papel limpio
- Sobre un envoltorio de plástico que se coloca entre el asiento y la taza del inodoro
- Con una bacinilla

Si recoge una muestra de un bebé:

- Colóquele un pañal al revés
- Recubra el pañal con un envoltorio de plástico

Cómo transportar una muestra

1. Coloque la muestra en un recipiente limpio y a prueba de derrames. Escriba la fecha y la hora en que recolectó la muestra.
2. Si es necesario, enfríela hasta que pueda llevarla al laboratorio.
3. Regrese la muestra al laboratorio lo antes posible (en un plazo de 24 horas).
4. Para el análisis de leucocitos fecales: recolecte la muestra en el vial O&P. No la guarde en el refrigerador. Consérvela a temperatura ambiente hasta que la regrese al laboratorio (dentro de las 24 horas).

No regrese una muestra que haya entrado en contacto con orina o agua del inodoro.

Visite healthlabtesting.com o escanee el código QR para consultar las ubicaciones y los horarios.

